

PLENVU INTESTINAL PREP EL MISMO DÍA



Las siguientes instrucciones son las instrucciones específicas de su médico. Siga las instrucciones cuidadosamente para garantizar una preparación exitosa.

Puede comunicarse con su asesor de pacientes si tiene preguntas de preparación no médica al: **800.349.0285**.

Puede comunicarse con el consultorio de su médico a través de la Red de Práctica de United Digestive al **866.468.6242**.

Notas especiales: Si está tomando aspirina, Coumadin (warfarina), Plavix (clopidogrel), Xarelto (rivaroxabán), Eliquis (apixabán) u otro medicamento anticoagulante, siga las instrucciones proporcionadas por su gastroenterólogo con respecto a si deben suspenderse antes de su procedimiento y cuándo. Si no está seguro, llame a su gastroenterólogo.

SEMANA DE PREPARACION DE UN VISTAZO

<p>7 días antes del procedimiento</p>	<p> Revise minuciosamente las instrucciones de preparación y los cambios/restricciones de medicamentos a partir de hoy.</p> <p>DEJE de tomar suplementos de hierro y multivitamínicos con hierro, dosis altas de aceite de pescado y fentermina.</p> <p>Compra los siguientes artículos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Plenvu Prep: la receta se envió electrónicamente a su farmacia.• Una (1) caja de tabletas laxantes Dulcolax.• Compre artículos dietéticos de líquidos claros, ungüento para la dermatitis del pañal y cualquier otro artículo que pueda necesitar mientras toma la preparación. <p>PACIENTES DIABÉTICOS</p> <p>Si usted es un paciente diabético, consulte las instrucciones adicionales para diabéticos en este paquete, que se encuentran en la página 5.</p>
<p>3 días antes del procedimiento</p>	<p> DEJE de comer verduras crudas o que contengan semillas, maíz, palomitas de maíz, nueces y semillas. Además, deje de tomar cualquier suplemento de fibra hasta después del procedimiento.</p> <p>Confirme los arreglos con su conductor.</p>
<p>2 días antes del procedimiento</p>	<p>Continúe con una dieta baja en fibra y recuerde evitar los alimentos con nueces y semillas.</p> <p>Preparación de un vistazo</p> <ul style="list-style-type: none">• 7:00 pm, tome dos tabletas de Dulcolax, después de la cena.
<p>1 día antes del procedimiento</p>	<p>NO SE PERMITEN ALIMENTOS SÓLIDOS, SOLO LÍQUIDOS CLAROS al levantarse, hasta después de su procedimiento. Una dieta de líquidos claros es necesaria para una colonoscopia. Vea los detalles del líquido transparente que se encuentran en la página 2.</p> <p>Preparación de un vistazo</p> <ul style="list-style-type: none">• 3:00 pm, beba la primera dosis de la solución de preparación.• 8:00 pm, beba la segunda dosis de la solución de preparación.• Beba mucha agua y líquidos a lo largo del día para evitar la deshidratación.
<p>Día del procedimiento</p>	<ul style="list-style-type: none">• Nada por la boca DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, o el procedimiento puede ser reprogramado.• NO GOMA DE MASCAR NI CAMELOS DUROS hasta después de su procedimiento. Puede cepillarse los dientes, pero no tragar.• Si toma medicamentos diarios, consulte la página 4 para obtener instrucciones específicas.

PLENVU INTESTINAL PREP EL MISMO DÍA

Detalles de la dieta de líquidos claros: **NO ROJO O MORADO. NO LÁCTEOS**

Aprobado

Refrescos, café, té,
jugos claros, aguas de fitness,
Paletas heladas sin pulpa,
caldo de pollo, verduras y carne de res,
gelatina

Evitar

NO leche/lácteos
NO jugos con pulpa
NO ROJO O MORADO



Día de preparación: Dos (2) días antes de su procedimiento

Continúe con una dieta baja en fibra y recuerde evitar los alimentos con nueces y semillas. Bebe mucha agua a lo largo del día para evitar la deshidratación.

1

Entre las 7:00 pm y las 9:00 pm dos (2) días antes de su procedimiento:

Tome 2 (5 mg) tabletas de Dulcolax con un vaso de agua.



Día de preparación: El día antes de su procedimiento

Limpie los líquidos solo el día anterior al procedimiento. No consuma alimentos sólidos al levantarse, hasta después de su procedimiento. Bebe mucha agua a lo largo del día para evitar la deshidratación.


- Suspenda el consumo de alcohol un día antes del procedimiento.
- **Pacientes diabéticos:** tome su dosis de medicamento oral para diabéticos como de costumbre. Para los pacientes con insulina, tome la mitad de su dosis habitual la noche anterior.

Su gastroenterólogo puede aconsejarle que agregue bisacodilo/Dulcolax antes de comenzar su preparación. Si se recomienda, siga las instrucciones dadas por el médico o el personal clínico.

2

3:00 pm del día anterior a su procedimiento:

Abra la caja y retire el sobre de Dosis 1.



3

3:00 pm del día anterior a su procedimiento:


Vacié el contenido en el recipiente de mezcla que viene con su PLENVU.



4

3:00 pm del día anterior a su procedimiento:

Agregue agua a la línea de llenado en el recipiente para mezclar (al menos 16 oz).



PLENVU INTESTINAL PREP EL MISMO DÍA

5

3:00 pm del día anterior a su procedimiento:

Revuelva hasta que todo el polvo se haya disuelto. Esto puede tardar varios minutos. **Consuma a su propio ritmo durante los próximos 30 minutos.**

4



6

Después de terminar el paso 5:

Vuelva a llenar el recipiente de mezcla hasta la línea de llenado (al menos 16 oz) con líquidos claros y beba durante los próximos 30 minutos.


Las respuestas individuales a los laxantes pueden variar. Esta preparación provocará múltiples evacuaciones intestinales, por lo que se recomienda permanecer cerca de un baño.

7

8:00 pm la noche anterior a su procedimiento:

Abra la caja y retire el **sobre A de la dosis 2** y el **sobre B de la dosis 2**.

1



8

8:00 pm la noche anterior a su procedimiento:

Vacié el contenido de ambos sobres en el recipiente de mezcla que viene con su PLENVU.

2




9

8:00 pm la noche anterior a su procedimiento:

Agregue agua a la línea de llenado en el recipiente para mezclar (al menos 16 oz).

3



10

8:00 pm la noche anterior a su procedimiento:

Revuelva hasta que todo el polvo se haya disuelto. Esto puede tardar varios minutos. **Consuma a su propio ritmo durante los próximos 30 minutos.**

4



11

Después de terminar el paso 10:

Vuelva a llenar el recipiente de mezcla hasta la línea de llenado (al menos 16 oz) con líquidos claros y beba durante los próximos 30 minutos.

El día de su procedimiento

Instrucciones de medicación

- En el caso de los pacientes diabéticos, mantenga todos los medicamentos para diabéticos, incluida la insulina, hasta después de su procedimiento.
- A menos que su médico le dé otras instrucciones, los medicamentos recetados para el asma, la presión arterial, el corazón, las convulsiones o los medicamentos antipsicóticos se pueden tomar según lo programado con un pequeño sorbo de agua al menos 2 horas antes de su procedimiento. Por favor, no tome nada más por vía oral hasta que se complete su procedimiento.

Información adicional

- Absténgase de fumar el día de su procedimiento para cumplir con los requisitos de anestesia. Si usted es fumador, es importante que evite fumar antes de su procedimiento.
- Pacientes con asma: por favor, traigan su inhalador con ustedes.
- **DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE**
 - NADA POR LA BOCA
 - NO COMER NI BEBER NADA HASTA DESPUÉS DE SU PROCEDIMIENTO
 - NO GOMA DE MASCAR NI CAMELOS DUROS
 - PUEDE CEPILLARSE LOS DIENTES, PERO NO TRAGAR
- Si su procedimiento requiere sedación, un conductor (mayor de 18 años) debe acompañarlo a su cita. La persona que lo lleva a casa debe permanecer en el centro mientras se realiza su procedimiento para que esté disponible en el improbable caso de una emergencia. No puede ir a casa en un taxi, viaje compartido (Uber/Lyft) ni tomar el transporte público. La sedación que recibirá le impedirá conducir de manera segura o trabajar el día de su procedimiento. Después de su procedimiento, no conduzca, opere maquinaria pesada ni firme documentos legales durante 24 horas.
- **Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la preparación, comuníquese con su asesor de pacientes llamando al 800.349.0285 o enviando un correo electrónico a support@yourpatientadvisor.com.**

Es importante dejar su nombre para su asesor de pacientes y verificar su número de teléfono para devolver la llamada si se le solicita. Su asesor de pacientes le devolverá la llamada lo antes posible.

PLENVU INTESTINAL PREP EL MISMO DÍA

INSTRUCCIONES PARA PACIENTES DIABÉTICOS

Es importante mantener el nivel de azúcar en la sangre controlado cuando se somete a un procedimiento ambulatorio. Las siguientes instrucciones lo guiarán en el manejo de sus medicamentos para la diabetes antes de su procedimiento.

EL DÍA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO

- Tome su medicamento para la diabetes (oral o insulina) como de costumbre.

LA NOCHE ANTES DE SU PROCEDIMIENTO

- Si está tomando medicamentos orales para la diabetes, continúe con la dosis habitual hasta la medianoche.
- Si toma insulina:
 - Tome la mitad de su cantidad habitual de insulina nocturna (vea los ejemplos a continuación que incluyen todos los tipos de insulina, como NPH, 70/30, 50/50, Regular, Humalog y Lente).
 - Ejemplo 1: Su dosis vespertina habitual es de 15 unidades de NPH y 8 unidades de dosis regular. Tomaría 7 unidades de NPH y 4 unidades de NPH la noche anterior a su procedimiento.
 - Ejemplo 2: Su dosis vespertina habitual es de 27 unidades de insulina 70/30. Tomaría 13 unidades de insulina 70/30 la noche anterior a su procedimiento.
- NADA DE COMER O BEBER DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE. Esto incluye caramelos duros y goma de mascar. Se le permite cepillarse los dientes, pero no tragar.

LA MAÑANA DE SU PROCEDIMIENTO

- Nada de comer ni de beber. Esto incluye caramelos duros y goma de mascar. Se le permite cepillarse los dientes, pero no tragar.
- Controle su nivel de azúcar en la sangre a primera hora de la mañana (y a las 12:00 del mediodía si no está en el hospital o en el centro ambulatorio) y anote los resultados. Lleve estos resultados y su registro de azúcar en la sangre (junto con sus pastillas para la diabetes y/o insulina) al hospital o centro ambulatorio.
- Si está tomando pastillas para la diabetes o inyecciones de insulina:
 - NO tome sus pastillas ni insulina la mañana de su procedimiento.
- Si usa una bomba de insulina:
 - Suspenda la función de bolo cuatro (4) horas antes de la hora de llegada.
 - Si su nivel de azúcar en la sangre está en un rango aceptable, disminuya la función basal al 50% de su tasa normal.
 - Si su nivel de azúcar en la sangre es inferior a 60, tome una de las siguientes 2 horas antes de su llegada al hospital o centro ambulatorio:
 - a. 3 tabletas de glucosa
 - b. 4 onzas de jugo (jugo claro como manzana o uva blanca)
 - c. 6 Life Savers™ (NO ROJO O MORADO)

Preguntas frecuentes sobre la preparación intestinal

¿Qué es un heces transparente?

Un heces transparente puede tener un ligero tinte amarillo o marrón. Será completamente transparente y no contendrá ninguna materia sólida.

No estoy defecando, ¿qué debo hacer?

Las deposiciones pueden tardar hasta 5-6 horas después de comenzar la preparación. Tenga paciencia, continúe bebiendo líquidos claros. Si no ha defecado antes de la medianoche de la noche anterior a su procedimiento, deberá comunicarse con el médico de guardia para obtener más instrucciones.

La preparación me está dando náuseas, ¿qué debo hacer?

Si tiene náuseas o vómitos, disminuya la velocidad a la que bebe la solución. Por favor, intente beber toda la solución laxante, incluso si le lleva más tiempo. Si los vómitos persisten o no puede terminar la preparación, deténgala y comuníquese con el consultorio de su médico durante el horario laboral normal o hable con el médico de guardia.

¿Cuáles son algunos de los alimentos ricos en fibra que debo evitar?

Las frutas y verduras crudas suelen tener un alto contenido de fibra, así como los frutos secos, las semillas, los panes y frijoles integrales y las lentejas.

¿Cuáles son algunas buenas opciones para alimentos bajos en fibra?

Elija pan blanco y arroz blanco para opciones bajas en fibra, así como pastas hechas con harina blanca. El pollo, el pescado, los lácteos y los huevos también son bajos en fibra y son buenas opciones de alimentos 2-3 días antes de comenzar su preparación.

Si como palomitas de maíz o semillas 3 días antes de mi procedimiento, ¿tengo que reprogramarlo?

No tendrá que reprogramar su procedimiento; Sin embargo, las semillas o los frutos secos pueden causar una dificultad en la detección y requerir la necesidad de volver a realizar la detección. Si ha comido una gran cantidad de semillas o frutos secos, es posible que desee ponerse en contacto con su proveedor o con su asistente médico.

¿Puedo beber ALCOHOL en la dieta líquida?

El alcohol no está permitido como parte de la dieta líquida.

¿Puedo seguir con la dieta líquida después de empezar a consumir los laxantes?

Sí, puede continuar con la dieta líquida hasta que se le indique que suspenda cualquier cosa por vía oral, lo que generalmente es de 4 a 6 horas antes del procedimiento.

¿Por qué tengo que levantarme tan temprano para la 2ª dosis, no puedo tomarla toda la noche anterior? (No se aplica a las instrucciones de preparación para el mismo día)

Una preparación que se toma en dos períodos de tiempo diferentes se denomina preparación de dosis dividida. Este protocolo de preparación ha demostrado ser el más eficaz para una colonoscopia exitosa. Es esencial que siga las instrucciones proporcionadas con sus medicamentos de preparación.

Si peso menos de 100 libras, ¿necesito tomar toda la preparación?

La cantidad de líquido no depende del peso. Es importante terminar la preparación para una colonoscopia exitosa.