

# MOVIPREP PREPARACIÓN EL MISMO DÍA

Las siguientes instrucciones son las instrucciones específicas de su médico. Por favor, siga las instrucciones cuidadosamente para asegurar una preparación exitosa.

Puede comunicarse con su asesor de pacientes con preguntas de preparación no médicas al: **800.349.0285**.

Puede comunicarse con el consultorio de su médico a través de United Digestive's Practice Network al: **866.468.6242**.

**Notas especiales:** Si está tomando aspirina, Coumadin (warfarina), Plavix (clopidogrel), Xarelto (rivaroxabán) Eliquis (apixabán) u otro medicamento anticoagulante, siga las instrucciones proporcionadas por su gastroenterólogo con respecto a si / cuándo deben suspenderse antes de su procedimiento. Si no está seguro, llame a su gastroenterólogo.

## SEMANA DE PREPARACIÓN DE UN VISTAZO

<p>7 días antes del procedimiento</p>	<p>Revise las instrucciones de preparación a fondo y los cambios / restricciones de medicamentos a partir de hoy.</p> <p> <b>DEJE</b> de tomar suplementos de hierro y multivitaminas con hierro, dosis altas de aceite de pescado y fentermina.</p> <p><b>Compre los siguientes artículos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Moviprep</b> – La receta fue enviada electrónicamente a su farmacia.</li><li>• Compre artículos dietéticos líquidos claros, ungüento para la dermatitis del pañal y cualquier otro artículo que pueda necesitar mientras toma la preparación.</li></ul> <p><b>PACIENTES DIABÉTICOS</b></p> <p>Si usted es un paciente diabético, consulte las instrucciones adicionales para diabéticos en este paquete, que se encuentra en la página 5.</p>
<p>3 días antes del procedimiento</p>	<p> <b>DEJE de</b> comer verduras crudas o vegetales que contengan semillas, maíz, palomitas de maíz, nueces y semillas. Además, deje de tomar cualquier suplemento de fibra hasta después del procedimiento.</p> <p>Confirme los arreglos con su conductor.</p>
<p>2 días antes del procedimiento</p>	<p> Continúe con una dieta baja en fibra y recuerde evitar los alimentos con nueces y semillas.</p>
<p>1 día antes del procedimiento</p>	<p><b>NO ALIMENTOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS CLAROS SOLO</b> al levantarse, hasta después de su procedimiento. Una dieta de líquidos claros es necesaria para una colonoscopia. Vea los detalles del líquido transparente ubicados en la página 2.</p> <p><b>Prepárese de un vistazo</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>6:00 pm</b>, beba la primera dosis de la solución de preparación. Consulte las instrucciones detalladas paso a paso que se encuentran en la página 2.</li><li>• <b>9:00 pm</b>, beba la segunda dosis de la solución de preparación.</li><li>• Beba mucha agua y líquidos durante todo el día para evitar la deshidratación.</li></ul>
<p>Día del procedimiento</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nada por vía oral <b>4 horas antes</b> de su <b>hora de LLEGADA</b>, o el procedimiento puede ser reprogramado.</li><li>• <b>NO CHICLE O CAMELO DURO</b> hasta después de su procedimiento. Puede cepillarse los dientes, pero no tragar.</li><li>• Si toma medicamentos diarios, consulte la página 3 para obtener instrucciones específicas.</li></ul>

# MOVIPREP PREPARACIÓN EL MISMO DÍA

Detalles de la dieta de líquidos claros: **NO ROJO O PÚRPURA. NO LÁCTEOS**

## Aprobado

Refrescos, café, té,  
jugos claros, aguas de fitness,  
Paletas heladas sin pulpa,  
caldo de pollo, verduras y ternera,  
gelatina

## Evitar

NO leche/lácteos  
NO jugos con pulpa  
**NO ROJO O PÚRPURA**



## Día de preparación: El día antes de su procedimiento

**No alimentos sólidos al levantarse, hasta después de su procedimiento.** Beba mucha agua durante todo el día para evitar la deshidratación y para enjuagar el intestino.

- Suspenda el alcohol un día antes del procedimiento.
- **Pacientes diabéticos:** tome su dosis oral de medicamento para la diabetes como de costumbre. Para los pacientes con insulina, tome la mitad de su dosis habitual la noche anterior.

Su gastroenterólogo puede aconsejarle que agregue bisacodilo / Dulcolax antes de comenzar su preparación. Si se recomienda, siga las instrucciones dadas por el médico o el personal clínico.

## MEZCLAR LA PRIMERA DOSIS

1

**6:00 PM** la noche anterior a su procedimiento:

Vacíe 1 bolsa A y 1 bolsa B en el recipiente desechable de un litro.



2

**6:00 PM** la noche anterior a su procedimiento:

Agregue agua potable tibia a la línea superior del recipiente y mezcle para disolver.



3

**6:00 PM** la noche anterior a su procedimiento:

El contenedor MoviPrep está dividido por 4 marcas. Cada 15 minutos, beba la solución de preparación hasta la siguiente marca (aproximadamente 8 oz), hasta que se consuma el litro lleno.



4

**Después de finalizar el paso 3:**

Beba 16 onzas de un líquido transparente de su elección. Este es un paso necesario para garantizar una hidratación adecuada y una preparación efectiva.



*Las respuestas individuales a los laxantes pueden variar. Esta preparación causará múltiples movimientos intestinales, por lo tanto, se recomienda permanecer cerca de un baño.*

# MOVIPREP PREPARACIÓN EL MISMO DÍA

Si lo prefiere, mezcle la solución con anticipación y refrigere antes de beber. La solución reconstituida debe utilizarse en un plazo de 24 horas.

## MEZCLAR LA SEGUNDA DOSIS

5

**9:00 PM** la noche anterior a su procedimiento:

Vacíe 1 bolsa A y 1 bolsa B en el recipiente desechable de un litro.



6

**9:00 PM** la noche anterior a su procedimiento:

Agregue agua potable tibia a la línea superior del recipiente y mezcle para disolver.



7

**9:00 PM** la noche anterior a su procedimiento:

El contenedor MoviPrep está dividido por 4 marcas. Cada 15 minutos, beba la solución de preparación hasta la siguiente marca (aproximadamente 8 oz), hasta que se consuma el litro lleno.



8

**Después de finalizar el paso 7:**

Beba 16 onzas de un líquido transparente de su elección. Este es un paso necesario para garantizar una hidratación adecuada y una preparación efectiva.



## El día de su procedimiento

### Instrucciones para medicamentos

- Para los pacientes diabéticos, mantenga todos los medicamentos para la diabetes, incluida la insulina, hasta después de su procedimiento.
- A menos que su médico le dé otras instrucciones, los medicamentos recetados para el asma, la presión arterial, el corazón, las convulsiones o los medicamentos antipsicóticos se pueden tomar según lo programado con un pequeño sorbo de agua al menos 2 horas antes de su procedimiento. Por favor, no tome nada más por vía oral hasta que se complete su procedimiento.

# MOVIPREP PREPARACIÓN EL MISMO DÍA

---

## Información adicional

- Por favor, absténgase de fumar el día de su procedimiento para cumplir con los requisitos de anestesia. Si usted es fumador, es importante que evite fumar antes de su procedimiento.
- Pacientes con asma: por favor traiga su inhalador con usted.
- **4 HORAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO**
  - NADA POR BOCA
  - NADA DE COMER NI BEBER HASTA DESPUÉS DE SU PROCEDIMIENTO
  - NO CHICLE O CAMELOS DUROS
  - PUEDE CEPILLARSE LOS DIENTES, PERO NO TRAGAR
- Si su procedimiento requiere sedación, un conductor (de 18 años o más) debe acompañarlo a su cita. La persona que lo lleva a casa debe permanecer en las instalaciones mientras se realiza su procedimiento para que estén disponibles en el improbable caso de una emergencia. No puede ir a casa en un taxi, viaje compartido (Uber / Lyft) o tomar el transporte público. La sedación que recibirá le impedirá conducir con seguridad o trabajar el día de su procedimiento. Después de su procedimiento, no conduzca, opere maquinaria pesada ni firme documentos legales durante 24 horas.
- **Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la preparación, comuníquese con su asesor de pacientes llamando al 800.349.0285 o enviando un correo electrónico [a support@yourpatientadvisor.com](mailto:support@yourpatientadvisor.com).**

Es importante dejar su nombre para su asesor de pacientes y verificar su número de teléfono de devolución de llamada si se le solicita. Su asesor de pacientes le devolverá la llamada lo antes posible.

# MOVIPREP PREPARACIÓN EL MISMO DÍA

## INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE DIABÉTICO

Es importante mantener su nivel de azúcar en la sangre controlado cuando se somete a un procedimiento ambulatorio. Las siguientes instrucciones lo guiarán en el manejo de sus medicamentos para la diabetes antes de su procedimiento.

### EL DÍA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO

- Tome su medicamento para la diabetes (oral o insulina) como de costumbre.

### LA NOCHE ANTES DE SU PROCEDIMIENTO

- Si está tomando medicamentos orales para la diabetes, continúe con la dosis habitual hasta la medianoche.
- Si toma insulina:  
Tome la mitad de su cantidad habitual de insulina nocturna (vea ejemplos a continuación que incluyen todos los tipos de insulina, como NPH, 70/30, 50/50, Regular, Humalog y Lente).  
Ejemplo 1: Su dosis habitual de la noche es de 15 unidades de NPH y 8 unidades de regular. Usted tomaría 7 unidades de NPH y 4 unidades de regular la noche anterior a su procedimiento.  
Ejemplo 2: Su dosis habitual de la noche es de 27 unidades de insulina 70/30. Usted tomaría 13 unidades de insulina 70/30 la noche antes de su procedimiento.
- NADA PARA COMER O BEBER DESPUÉS DE LA MEDIANOCHES. Esto incluye caramelos duros y goma de mascar. Se le permite cepillarse los dientes, pero no tragar.

### LA MAÑANA DE SU PROCEDIMIENTO

- Nada para comer o beber. Esto incluye caramelos duros y goma de mascar. Se le permite cepillarse los dientes, pero no tragar.
- Controle su nivel de azúcar en la sangre a primera hora de la mañana (y a las 12:00 del mediodía si no está en el hospital o centro ambulatorio) y anote los resultados. Lleve estos resultados y su libro de registro de azúcar en la sangre con usted (junto con sus pastillas para la diabetes y / o insulina) al hospital o centro ambulatorio.
- Si está tomando pastillas para la diabetes o toma inyecciones de insulina:  
NO tome sus pastillas ni insulina la mañana del procedimiento.
- Si usa una bomba de insulina:
  - Suspenda la función de bolo cuatro (4) horas antes de la hora de llegada.
  - Si su nivel de azúcar en la sangre está en un rango aceptable, disminuya la función basal al 50% de su tasa normal.
  - Si su nivel de azúcar en la sangre es inferior a 60, tome una de las siguientes 2 horas antes de su llegada al hospital o centro ambulatorio:
    - a. 3 tabletas de glucosa
    - b. 4 onzas de jugo (jugo claro como manzana o uva blanca)
    - c. 6 Life Savers™ (NO ROJO O MORADO)

## Preguntas frecuentes sobre la preparación intestinal

### ¿Qué es un heces transparente?

Un heces transparente puede tener un ligero tinte de amarillo o marrón. Será completamente transparente y no contendrá ninguna materia sólida.

### No estoy defecando, ¿qué debo hacer?

Los movimientos intestinales pueden tomar hasta 5-6 horas después de comenzar la preparación para comenzar. Sea paciente, continúe bebiendo líquidos claros. Si no ha tenido una evacuación intestinal antes de la medianoche de la noche anterior a su procedimiento, deberá comunicarse con el médico de guardia para obtener más instrucciones.

### La preparación me está dando náuseas, ¿qué debo hacer?

Si desarrolla náuseas o vómitos, disminuya la velocidad a la que bebe la solución. Por favor, trate de beber toda la solución laxante, incluso si le lleva más tiempo. Si el vómito persiste o si no puede terminar la preparación, detenga la preparación y comuníquese con el consultorio de su médico durante el horario comercial normal o hable con el médico de guardia.

### ¿Cuáles son algunos alimentos ricos en fibra que debo evitar?

Las frutas y verduras crudas son típicamente altas en fibra, así como nueces, semillas, panes integrales, frijoles y lentejas.

### ¿Cuáles son algunas buenas opciones para los alimentos bajos en fibra?

Elija pan blanco y arroz blanco para opciones bajas en fibra, así como pastas hechas con harina blanca. El pollo, el pescado, los productos lácteos y los huevos también son bajos en fibra y son buenas opciones para los alimentos 2-3 días antes de comenzar su preparación.

### Si como palomitas de maíz o semillas 3 días antes de mi procedimiento, ¿necesito reprogramar?

No necesitará reprogramar su procedimiento; Sin embargo, las semillas o nueces pueden causar una dificultad en la detección y requieren la necesidad de volver a examinar. Si ha comido una gran cantidad de semillas o nueces, es posible que desee comunicarse con su proveedor o su asistente médico.

### ¿Puedo beber ALCOHOL en la dieta líquida?

El alcohol no está permitido como parte de la dieta líquida.

### ¿Puedo seguir la dieta líquida después de comenzar a consumir los laxantes?

Sí, puede continuar con la dieta líquida hasta que se le indique suspender cualquier cosa por vía oral, que generalmente es de 4 a 6 horas antes del procedimiento.

### ¿Por qué tengo que levantarme tan temprano para la segunda dosis, no podría tomarla toda la noche anterior? *(NO aplica para las instrucciones de preparación del mismo día.)*

Una preparación dividida ha demostrado ser la más efectiva para una colonoscopia exitosa. Es esencial que siga las instrucciones proporcionadas con sus medicamentos de preparación.

### Si peso menos de 100 libras, ¿necesito tomar toda la preparación?

La cantidad de líquido no depende del peso. Es importante terminar la preparación para una colonoscopia exitosa.